

Anexo II

Formulário Nacional de Medicamentos

<https://extranet.infarmed.pt/fnm-fo/#/FichaMedicamento/Ranitidina>

The screenshot displays the FNM website interface. At the top, there is a navigation bar with the FNM logo and menu items: INÍCIO, O QUE É O FNM?, FAQ, AJUDA, and social media icons. A search bar contains the text "EX: Paracetamol". Below the search bar, a sidebar on the left lists therapeutic groups, and the main content area shows the profile for "RANITIDINA".

6.2.2 - Antagonistas dos recetores H2

- Tratamento das úlceras duodenal e gástrica, no tratamento profilático da ulcera duo(...)
- Tratamento das úlceras duodenal e gástrica, no tratamento profilático da ulcera duo(...)

6.2.2.2 - Antagonistas dos recetores H2

Indicação de utilização

Tratamento das úlceras duodenal e gástrica, no tratamento profilático da ulcera duodenal e da esofagite de refluxo e no tratamento do síndrome de Zollinger-Ellison.

Ficha técnica

Patologia(s)

K20-K31 Doenças do esofago, do estômago e do duodeno

Alternativas Terapêuticas

DCI	NÍVEL	CONDIÇÕES
Cimetidina		
Famotidina		

Switch

Sim

Considerações

Doses equipotentes dos fármacos na mesma classe terapêutica ou mudança de classe terapêutica iniciando pela dose indicada para aquele doente devendo fazer ajuste de dose e da hora de administração (consoante o fármaco) até atingir o efeito terapêutico pretendido. Todos os medicamentos aqui incluídos são para tratamento temporalmente limitado (4-8 semanas) no caso dos IBP e dos antagonistas H2, e entre 7-14 dias no caso dos antiácidos. Excepcionalmente, em alguns doentes, podem ser consideradas terapêuticas intermitentes com os mesmos fármacos ou alternando fármacos de classes distintas. Mudança de outros antiácidos ou